

¿Se puede tratar la sífilis?

Sí, la sífilis generalmente se trata con inyecciones de antibióticos. Aunque haya recibido tratamiento contra la infección, puede ser re-infectado al exponerse nuevamente. Es importante usar condones cada vez que tenga relaciones sexuales para reducir el riesgo de adquirir sífilis y otras ITS.

¿Se debe tratar mi pareja?

Sí. Si tiene contacto sexual con una pareja que no haya recibido tratamiento, puede volver a infectarse.



¿Qué ocurre si no se trata la sífilis?

Si no se trata, la sífilis puede provocar problemas de salud graves. Una infección prolongada sin tratamiento puede dañar los órganos internos. Además, las personas con sífilis son más propensas a contraer VIH si están expuestas.

¿Puede la sífilis afectar a una mujer embarazada y a su feto?

Sí. La sífilis puede provocar problemas graves a una mujer embarazada y a su feto.

¿Cómo se puede proteger contra la sífilis?

El único método 100% eficaz para prevenir la sífilis es no tener relaciones sexuales. Si tienes relaciones sexuales, puede limitar el riesgo al tomar las siguientes medidas:

- Use siempre un condón o una barrera de protección bucal de látex o poliuretano durante las relaciones anales, vaginales o el sexo oral
 - Los condones fabricados de materiales "naturales" pueden evitar un embarazo, pero NO las ITS
- Si decide tener sexo, reduzca la cantidad de parejas sexuales
- Hable con su pareja acerca de su estado de ITS y de hacerse la prueba
- Hable con su proveedor de salud médica acerca de prácticas sexuales seguras y de cómo hacerse la prueba.
- Entienda que tener relaciones sexuales mientras se encuentra bajo los efectos de drogas o alcohol puede aumentar las probabilidades de tener sexo sin protección.

Para obtener más información, visite:

<http://www.bphc.org/whatwedo/sexual-health>

o <http://www.cdc.gov/std>

Sífilis



Boston Public Health Commission
Infectious Disease Bureau
1010 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02118
www.bphc.org
617-534-5611

Spanish

¿Qué es la sífilis?

La sífilis es una Infección de Transmisión Sexual (STI) causada por bacterias.

¿Cómo se contrae la sífilis?

La sífilis se transmite de una persona a otra mediante el contacto directo de piel a piel con una ulcera sifilítica. Las úlceras sifilíticas pueden aparecer en la vagina, el pene, el ano, la boca, los labios o el recto. La sífilis se puede transmitir durante las relaciones sexuales vaginales, anales o durante el sexo oral. La sífilis se puede contagiar aunque la ulcera sifilítica no se vea ni se sienta, por lo que las personas pueden contagiar la sífilis aunque no sepan que están infectadas. La sífilis también se puede transmitir de una mujer embarazada al feto.

Tiene más probabilidades de desarrollar una infección si:

- Tiene relaciones sexuales sin usar un condón de látex o poliuretano.
- Tiene múltiples parejas sexuales.
- Tiene otra ITS o VIH.
- Tiene relaciones sexuales bajo los efectos de drogas o alcohol (es menos probable que los condones se utilicen correctamente).

¿Quién puede contraer sífilis?

Cualquier persona que este sexualmente activa puede contraer sífilis. Tener sexo sin protección (sexo sin un condón) aumenta las probabilidades de contraer gonorrea. Aunque hombres y mujeres tienen riesgo de contraer la infección, más de la mitad de los casos reportados en los EE. UU. se dan en hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

¿Cuáles son los síntomas de la sífilis?

Los síntomas de la sífilis son diferentes según la etapa de la enfermedad. La enfermedad tiene cuatro etapas: primaria, secundaria, latente y terciaria.

Síntomas de la etapa primaria

- Una o más úlceras dolorosas (chancros) en los genitales o en la boca, el ano o el recto.
- La ulcera demora entre 3 a 6 semanas en desaparecer por sí sola. No obstante, si no recibe tratamiento, la enfermedad avanzará a la siguiente etapa.

Síntomas de la etapa secundaria

- Erupción en las manos y los pies, o en otras partes del cuerpo. La erupción generalmente es de color rojo o marrón y no pica.
- Otros síntomas también incluyen fiebre, dolor de garganta, dolor muscular, cefalea, pérdida del cabello y sensación de cansancio. Los síntomas pueden desaparecer solos. No obstante, si no recibe tratamiento, la enfermedad avanzará a la siguiente etapa.

Síntomas de la etapa latente

- No hay síntomas pero se puede detectar la enfermedad mediante un análisis de sangre. Esta etapa puede durar muchos años.

Síntomas de la etapa terciaria

- Los síntomas pueden incluir dificultad para mover los brazos y las piernas, parálisis, adormecimiento, ceguera y cardiopatía.

¿Durante cuánto tiempo puede una persona infectada transmitir la sífilis?

Las personas que no reciben tratamiento son más propensas de transmitir la infección durante el primer año de infección. Cuanto más tiempo pase una persona infectada sin recibir tratamiento, más alto será el riesgo de desarrollar problemas graves de largo plazo.

¿Cómo puedo saber si tengo sífilis?

La única manera de saber con certeza si tiene sífilis es haciéndose la prueba. Los proveedores de salud médica generalmente analizan la presencia de sífilis de una muestra de sangre. Dado que la sífilis sin tratar puede provocar problemas al feto, todas las mujeres embarazadas deben hacerse una prueba para detectar la presencia de sífilis. Las personas cuyas actividades sexuales los exponen al riesgo de infectarse de sífilis deben realizarse la prueba con frecuencia para poder recibir tratamiento rápidamente en caso de ser infectados.

¿Dónde me puedo hacer la prueba?

La mayoría de los proveedores de salud médica ofrecen pruebas de sífilis y otras ITS. Para encontrar un centro de atención médica cercano, llame a la Línea de Salud del Alcalde al 617-534-5050 o visite <http://www.hivtest.org/STDTesting.aspx>.

